

EUROPEAN PSYCHIATRY

VOL 8/No 6

1993

ISSN 0767 - 399 X
SCSPED II (1) 281 - 338
PSYPEK (8) (6)

ex PSYCHIATRIE & PSYCHOBIOLOGIE

THE JOURNAL OF THE ASSOCIATION OF EUROPEAN PSYCHIATRISTS

REVIEW

- Treatment duration of psychiatric disorders: long-term treatment of resistant schizophrenia**
JM Kane (New York, USA) 281

METHODOLOGY

- Evaluation of safety and side effects in the process of anti-anxiety drug development**
M Bourin, A Couetoux du Tertre, R Payeur (Nantes, France; Hull, Canada) 285

ORIGINAL ARTICLES

- Obstetric complications in distinct schizophrenic subgroups**
G Stöber, E Franzek, H Beckman (Wuerzburg, Germany) 293

- Visual field processing in paranoid and non-paranoid schizophrenics**
E Aharonovich, N Karny, J Nachson (Ramat Gan, Israel) 301

- Loss of automatic processes and blunted-affect in depression: a P3 study**
A Partiot, A Pierson, J Le Houezec, V Dodin, B Renault, R Jouvent (Paris, France) 309

- Comparison of the efficacy of moclobemide and fluvoxamine in elderly patients with a severe depressive episode**
JP Bocksberger, JP Gachoud, J Richard, P Dick (Geneva, Reinach, Switzerland) 319

RAPID COMMUNICATION

- Secondary psychotic symptoms in a patient with biphasis meningo-encephalitis**
S Modell, G Kurtz, F Müller-Spahn, E Schmözl (Munich, Germany) 325

LETTER TO THE EDITOR

- Psychopathology: Far-east of Asia and West-ends of Europe and Africa**
F Okada (Sapporo, Japan) 329

Comments

- P Pichot, N Sartorius, A Frances* 330

- Agenda** 332

- Index** 333

- Instructions to authors** Inside back cover



ELSEVIER

Quitaxon

DOXEPINE

le Tricyclique du bien-être




Calme l'Anxiété



Traite la Dépression



Rétablit le Sommeil



Formes et présentations : comprimés pelliculés sécables à 10 mg (boîte de 40) et de 50 mg (boîte de 20). Solution buvable en gouttes de 10mg/ml (flacon de 30 ml) et solution injectable à 25 mg/2 ml (boîte de 10 ampoules).
Propriétés : antidépresseur imipraminique ayant également une activité anxiolytique et sédatif. **Sort du médicament :** la doxépine est bien absorbée par voie orale et elle est rapidement détectable dans le sang (pic 1 à 2 heures après l'administration). **Indications :** comprimés à 50 mg et solution injectable : états dépressifs. Comprimés à 10 mg et solution buvable : états anxiodépresseurs et états dépressifs. **Contre indications :** association aux IMAO, non respecter un délai de 15 jours après l'arrêt d'un traitement de ce type de médicament). Risques de rétention urinaire liés à des troubles uréthroprostatiques. Glaucome par fermeture de l'angle. Insuffisance rénale ou hépatique grave.
Contre indications relatives : alcool, adrénaline, noradrénaline (cf. interactions médicamenteuses). **Précautions d'emploi :** l'alcool est fortement déconseillé. Prudence en cas d'hypertrophie prostatique, en cas d'hypertension artérielle, en cas de maladie cardiaque, en cas de maladie pulmonaire chronique, en cas de maladie rénale chronique, en cas de maladie hépatique chronique, en cas de maladie thyroïdienne, en cas de maladie endocrinienne, en cas de maladie auto-immune, en cas de maladie infectieuse, en cas de maladie parasitaire, en cas de maladie fongique, en cas de maladie bactérienne, en cas de maladie virale, en cas de maladie protozoaire, en cas de maladie helminthique, en cas de maladie parasitaire, en cas de maladie fongique, en cas de maladie bactérienne, en cas de maladie virale, en cas de maladie protozoaire, en cas de maladie helminthique.
Associations déconseillées : alcool (majoration par l'alcool de l'effet sédatif). Epinephrine ou Adrénaline, Norépinephrine ou Noradrénaline (risque d'HTA paroxystique). **Associations à utiliser avec précaution :** benzodiazépines, barbituriques, benzodiazépines, clonidine et apparentés, hypnotiques, dérivés morphiniques, neuroleptiques, tranquillisants, anticholinergiques, antispasmodiques, atropiniques, le disopyramide, les neuroleptiques phénothiaziniques (addition des effets indésirables atropiniques à type de rétention urinaire, constipation, sécheresse de bouche...). **Effets indésirables :** somnolence initiale, effets atropiniques cités précédemment, rares manifestations allergiques, possibilités de réactivation des crises comitiales. **Mode d'emploi et posologie :** en fonction de l'indication (état dépressif ou anxiodépresseur) la posologie et la forme employées seront adaptées. Pour une information complète, voir le Vidal. **Surdosage :** faire évacuer le produit ingéré et faire hospitaliser immédiatement le malade. Liste 1 A.M.M. 312 602-6 (1988) comprimés 50 mg 333 292-6 (1990) comprimés 10 mg 312 587-2 (1988) solution buvable en goutte ; 312 602-6 (1988) solution injectable.

EUROPEAN PSYCHIATRY

The journal of the Association of European Psychiatrists

Editors: C Ballus (Barcelona), JD Guelfi (Paris), H Heimann (Tübingen), R Murray (London)

Co-Editors: M Maj (Naples), CB Pull (Luxembourg), M Ackenheil (Munich), P Bech (Copenhagen)

Deputy editors: P Boyer, Y Lecrubier (Paris). *Secretariat:* Hôpital de la Salpêtrière, Pavillon Clérambault, 47, bd de l'Hôpital, 75651 Paris Cedex 13, France. Tel: (0033) 1 45 86 70 22. Fax: (0033) 1 44 23 92 49

Advisory board

J Adès, *Colombes, France*
HS Akiskal, *Rockville, USA*
NC Andreasen, *Iowa City, USA*
J Angst, *Zurich, Switzerland*
P Baumann, *Lausanne, Switzerland*
H Beckmann, *Würzburg, Germany*
P Berner, *Vienna, Austria*
A Bertelsen, *Risskov, Denmark*
J Birley, *London, UK*
JC Bisserte, *Meudon, France*
D Bobon, *Glain-Liège, Belgium*
B Bondy, *Munich, Germany*
JP Boulenger, *Sherbrooke, Canada*
F Brambilla, *Milan, Italy*
I Brockington, *Birmingham, UK*
A Clare, *Dublin, Ireland*
V Clerget-Darpoux, *Paris, France*
F Conde Lopez, *Valladolid, Spain*
S Consoli, *Paris, France*
J Cottraux, *Lyons, France*
M von Cranach, *Kaufbeuren, Germany*
A Dahl, *Oslo, Norway*
JM Danion, *Strasbourg, France*
JFW Deakin, *Manchester, UK*
M de Bonis, *Le Kremlin Bicêtre, France*
H Dufour, *Lausanne, Switzerland*
R Engel, *Munich, Germany*
L Farde, *Stockholm, Sweden*
A Féline, *Le Kremlin Bicêtre, France*
A Fernandes da Fonseca, *Porto, Portugal*
F Ferrero, *Geneva, Switzerland*
M Fichter, *Prien am Chiemsee, Germany*
H Freeman, *London, UK*

HJ Gaertner, *Tübingen, Germany*
J Gibert, *Cádiz, Spain*
D Goldberg, *Manchester, UK*
I Hand, *Hamburg, Germany*
WE Haefely, *Basel, Switzerland*
H Häfner, *Mannheim, Germany*
T Helgason, *Reykjavik, Iceland*
H Hippus, *Munich, Germany*
A Jablenski, *Sofia, Bulgaria*
E Johnston, *Edinburgh, UK*
M Kastrup, *Hvidovre, Denmark*
D Kemali, *Naples, Italy*
R Kendall, *Edinburgh, UK*
D Klein, *New York, USA*
R Klein, *New York, USA*
S Langer, *Paris, France*
J Lellouch, *Villejuif, France*
T Lemperrière, *Colombes, France*
J-P Lépine, *Paris, France*
OM Lesch, *Vienna, Austria*
SW Lewis, *London, UK*
H Léo, *Paris, France*
JJ Lopez-Ibor, *Madrid, Spain*
P McGuffin, *Cardiff, UK*
W Maier, *Mainz, Germany*
A Mann, *London, UK*
K Mann, *Tübingen, Germany*
I Marks, *London, UK*
J Marlet, *Venray, The Netherlands*
J Massana Ronquillo, *Barcelona, Spain*
J Mendlewicz, *Brussels, Belgium*
HJ Möller, *Bonn, Germany*
D Naber, *Munich, Germany*

E O'Callaghan, *Dublin, Ireland*
Y Ono, *Tokyo, Japon*
M Patris, *Strasbourg, France*
J Pellet, *Saint-Etienne, France*
C Perris, *Umeå, Sweden*
P Pichot, *Paris, France*
H Pope, *Belmont, USA*
AJ Puech, *Paris, France*
G Racagni, *Milan, Italy*
N Retterstøl, *Oslo, Norway*
M A Ron, *London, UK*
R Rosenberg, *Risskov, Denmark*
M Roth, *Cambridge, UK*
F Rouillon, *Colombes, France*
J Saiz-Ruiz, *Madrid, Spain*
A Sanchez-Blanc, *Zaragoza, Spain*
N Sartorius, *Geneva, Switzerland*
F Schulsinger, *Copenhagen, Denmark*
G Sedvall, *Stockholm, Sweden*
L Singer, *Strasbourg, France*
CN Stefanis, *Athens, Greece*
E Straube, *Tübingen, Germany*
E Strömgen, *Risskov, Denmark*
E Taylor, *London, UK*
P Taylor, *London, UK*
L Träskman-Bendz, *Lund, Sweden*
J Vallejo Ruibola, *Barcelona, Spain*
D Widlöcher, *Paris, France*
J Wilmotte, *Marchienne du Pont, Belgium*
J Wing, *London, UK*
FT Zimmer, *Tübingen, Germany*
J Zohar, *Beer-Sheva, Israel*

Association of European Psychiatrists

President: P Bech (Copenhagen); *Past President:* C Ballus (Barcelona); *President Elect:* R Murray (London); *Secretary General:* C Pull (Luxembourg); *Treasurer:* M Patris (Strasbourg); *Counsellors:* D Kemali (Naples), J Angst (Zurich); *Section:* L Singer (Strasbourg).



ÉDITIONS SCIENTIFIQUES ELSEVIER

29, rue Buffon, F-75005 Paris

A member of the Reed Elsevier group

Tel: (1) 47 07 11 22 – Telecopier: (1) 43 36 80 93

SUBSCRIPTIONS 1993 – Vol 8 in 6 issues

• France: 1200 FF • Students: 720 FF • EEC: 1380 FF for organisms or firms (VAT registration number requested); 1405,09 FF for individuals • Excluding EEC: 1380 FF – Air delivery included.

Address order and payment to: Éditions Scientifiques Elsevier

Bank: CCP Paris, No 30041 00001 1904540H020/70.

– Subscriptions begin 4 weeks after receipt of payment and start with the first issue of the calendar year.

– Back issues and volumes are available from the publisher.

– Claims for missing issues should be made within six months of publication.

Consulting Translator: P Rousseau-Conningham.

Advertising: Éditions Scientifiques Elsevier (Anne Blanvillain).

© 1993 Éditions Scientifiques Elsevier, Paris

Tous droits de traduction, d'adaptation et de reproduction par tous procédés réservés pour tous pays. Loi du 11 mars 1957. Il est interdit de reproduire, même partiellement, la présente publication sans l'autorisation de l'éditeur ou du Centre Français du Copyright, 6 bis, rue Gabriel-Laumain, 75010 Paris.

All rights reserved. No part of this publication may be translated, reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any other means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of the publisher.

Saint-Paul France S.A., 55000 Bar-le-Duc
Dépôt légal: décembre 1993. N° 9-93-0992

Le directeur de la publication: Alain Devanlay
Commission paritaire: 68321
Périodicité bimestrielle