

SALIENDO DE LA DEPRESION



Fluoxamina
DUMIROX[®]
El antidepresivo de primera línea

Upjohn duphar

Composición: Maleato de fluoxamina, 50 mg ó 100 mg. **Indicaciones:** Tratamiento de los síntomas de la enfermedad depresiva. **Posología:** Dosis media eficaz: 100-200 mg/día. Dosis máxima: 300 mg/día. En ancianos puede utilizarse la misma posología. La mejoría producida por Dumirox, puede tardar dos semanas o más en aparecer. **Interacciones:** Si el paciente ha tomado IMAO, deberá esperar 15 días antes de iniciar el tratamiento con Dumirox. Dumirox puede prolongar la eliminación de fármacos que se metabolizan por oxidación en el hígado, especialmente los de margen terapéutico estrecho (fenitoína, teofilina). Se deberán disminuir las dosis de propranolol y warfarina cuando se administran junto con Dumirox. Puede administrarse con benzodiacepinas. La utilización conjunta con litio deberá hacerse con precaución. **Contraindicaciones:** No se conocen. **Advertencia:** A dosis altas, se tendrá precaución en tareas que exijan concentración, deberá evitarse el alcohol. **Precauciones:** Los pacientes con insuficiencia hepática o renal deberán iniciar el tratamiento con una dosis baja. Ocasionalmente el tratamiento con Dumirox se ha visto asociado a una elevación de las enzimas hepáticas que se normaliza al interrumpir el tratamiento. Su uso deberá evitarse cuando sea posible en pacientes con historial epiléptico. Puede producir ligera disminución de la frecuencia cardíaca. También se han observado en el ECG cambios en la repolarización aunque no se ha demostrado una relación causal con el fármaco. Se ha descrito muy raramente hipotensión. No se recomienda durante el embarazo y lactancia. Aunque existe experiencia no se recomienda por el momento en niños. **Efectos secundarios:** Normalmente es bien tolerado. Puede producir efectos de tipo gastrointestinal que suelen desaparecer en el curso del tratamiento. Otros efectos descritos son vértigo, somnolencia, agitación, dolor de cabeza, temblor, ansiedad e incidentes ligados a la naturaleza misma de la enfermedad tratada. Algunos pacientes han presentado convulsiones: si ello ocurriera debe interrumpirse el tratamiento. **Intoxicación y tratamiento:** En el caso de ingesta masiva accidental se procederá a lavado gástrico y tratamiento sintomático. Se recomienda el tratamiento con carbón activado. **Presentación:** En blíster: Envases conteniendo 30 comprimidos entéricos de 50 mg. cada uno (Dumirox 50 mg). P.V.P. IVA4-: 1.489,- ó 20 comprimidos entéricos de 100 mg. cada uno (Dumirox 100 mg). P.V.P. IVA4-: 1.919,-.



Buenas noches...

...insomnio

Mañana será un gran día



Dalparan®

ZOLPIDEM (D.C.I.)

La vanguardia en hipnóticos no benzodiazepínicos

Dalparan es un hipnótico cuyo principio activo, Zolpidem(D.C.I.) pertenece a una nueva familia química, no benzodiazepínica: las imidazopiridinas. PROPIEDADES Dalparan es una imidazopiridina de acción hipnótica rápida. Su efecto está ligado a una acción agonista sobre un receptor central que forma parte del complejo « receptores macromoleculares GABA - benzodiazepina centrales » modulador de la apertura del canal cloro. El Zolpidem reduce el período de latencia del sueño, reduce el número de despertares, aumenta la duración total del sueño y mejora su calidad. COMPOSICION:Cada comprimido contiene: Zolpidem (D.C.I.) Hemitartrato, 10 mg; Excip.: Lactosa y otros, c.s. INDICACIONES: Tratamiento a corto plazo del insomnio, en particular en pacientes con dificultad para conciliar el sueño. POSOLOGIA: En el adulto menor de 65 años: la posología usual es de un comprimido de 10 mg, inmediatamente antes de acostarse. En el adulto mayor de 65 años: comenzar el tratamiento por medio comprimido inmediatamente antes de acostarse. No debe sobrepasarse la posología de un comprimido (10mg) por día. En todos los casos, seguir estrictamente la prescripción de su médico. CONTRAINDICACIONES: Este medicamento no debe utilizarse en los casos siguientes: niños menores de 15 años; embarazo o lactancia (en este caso no olvidar informar a su médico) y miastenia grave. PRECAUCIONES: Informar a su médico en caso de enfermedades renales o hepáticas; dificultades respiratorias y/o enfermedades musculares (miastenia), en cuyo caso es necesaria una especial vigilancia médica. En caso de duda, consulte a su médico o farmacéutico. En personas de edad avanzada, el tratamiento debe empezar por medio comprimido y no debe sobrepasarse la dosis de un comprimido por día. La toma de bebidas alcohólicas puede reforzar o modificar el efecto de este medicamento. Está formalmente desaconsejado su consumo durante el tratamiento. Efectos sobre la capacidad de conducir vehículos o utilizar maquinaria de precisión: debe llamarse la atención de los conductores de vehículos y de las personas bajo tratamiento que utilicen maquinaria de precisión, en el sentido de un posible riesgo de somnolencia. Esta especialidad contiene lactosa. Se han descrito casos de intolerancia a este componente en niños y adolescentes. Aunque la cantidad presente en el preparado no es, probablemente, suficiente para desencadenar los síntomas de intolerancia, en caso de que aparecieran diarreas debe consultar a su médico. ADVERTENCIAS: El insomnio puede tener causas diversas. Algunas de ellas, no precisan obligatoriamente la toma de un medicamento. Como para todo hipnótico, la administración prolongada de Dalparan generalmente no es útil ni recomendada. En caso de levantarse por la noche después de la toma de un hipnótico pueden aparecer reacciones ralentizadas con riesgo de caídas y/o sensaciones de vértigo. INTERACCIONES: El empleo simultáneo de Dalparan con alcohol y con medicamentos que se emplean en trastornos del sistema nervioso (medicamentos para dormir, para la ansiedad, la depresión, etc.) puede aumentar los efectos farmacológicos, incrementándose el riesgo de efectos secundarios. Por ello, con el fin de evitar cualquier interacción con otro medicamento, es necesario informar sistemáticamente a su médico si usted está tomando algún otro medicamento. EFECTOS SECUNDARIOS: Como todo producto activo, este medicamento puede producir en algunas personas efectos más o menos molestos como sensación de vértigo, fatiga, náuseas, dolores de cabeza, trastornos de la memoria, agitación nocturna, diarreas, temblores, caídas. No dude en pedir consejo a su médico o farmacéutico. INTOXICACION Y SU TRATAMIENTO: En caso de sobredosis conviene tomar las medidas habituales de precaución: lavado gástrico, vigilancia de los parámetros cardiorrespiratorios y traslado a un centro especializado. PRESENTACION Y PVP: Caja con 30 comprimidos de 10 mg, PVP IVA 4- 691 Ptas. CON RECETA MEDICA. INCLUIDO EN LA SEGURIDAD SOCIAL. Coste tratamiento día: 23.03 Ptas. Licencia de Synthelabo.

 **farma-lepori, s.a.** Osio 7 y 9 08034 Barcelona