

Elsevier Science on the Internet

Your comprehensive
and easy-to-use guide to
the world-wide range of
Elsevier Science products
and services.

Visit Elsevier Science
on the Internet and access
a unique repository of
information covering the
entire scientific spectrum.
Our time-saving search
facilities will lead you
to our frequent updates
in seconds.

Main features include:

Alerting and awareness
facilities for new and forthcoming
publications.

Fast, time-saving search facilities.

Frequent updates.

<http://www.elsevier.com>

<http://www.elsevier.nl>



ELSEVIER



PERGAMON



NORTH
HOLLAND



EXCERPTA
MEDICA

IXEL 50 mg

INHIBITEUR DE LA RECAPTURE
DE LA SÉROTONINE ET DE LA NORADRÉNALINE

VOTRE ALLIÉ CONTRE LA DÉPRESSION

MILNACIPRAN 50 mg
IXEL

Gélules dosées à 50 mg et à 25 mg de milnacipran (chlorhydrate de milnacipran). PROPRIÉTÉS* : Antidépresseur/inhibiteur double de la recapture de la sérotonine (5-HT) et de la noradrénaline (NA). INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES : Episodes dépressifs majeurs (c'est-à-dire caractérisés). POSOLOGIE ET MODE D'ADMINISTRATION* : Réservé à l'adulte. 1 gélule de 50 mg le matin et 1 gélule de 50 mg le soir à prendre de préférence au cours des repas. Chez l'insuffisant rénal : une adaptation posologique est nécessaire. 1 gélule de 25 mg le matin et/ou 1 gélule de 25 mg le soir. Chez le sujet âgé : une adaptation posologique n'est pas nécessaire tant que la fonction rénale est normale. CONTRE-INDICATIONS : ne doit jamais être utilisé en cas de : hypersensibilité au milnacipran. Enfant de moins de 15 ans, en l'absence d'études. Association avec les IMAO non sélectifs, les IMAO sélectifs B et le sumatriptan (Cf. Interactions médicamenteuses). Ne doit généralement pas être utilisé en cas de : Association avec l'adrénaline et la noradrénaline par voie parentérale, la clonidine et apparentés, la digoxine et les IMAO sélectifs A. D'obstacle à l'évacuation vésicale (principalement hypertrophie prostatique). Grossesse et allaitement. MISES EN GARDE* : Comme lors de tout traitement par antidépresseur, le risque suicidaire chez les patients déprimés persiste en début de traitement, la levée de l'inhibition psychomotrice pouvant précéder l'action antidépresseive proprement dite. L'administration du milnacipran à des patients traités par des cardiotoniques nécessite une surveillance particulière. PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES D'EMPLOI* : Insomnie ou nervosité en début de traitement. En cas de virage maniaque franc, le traitement par le milnacipran sera interrompu. Alcool : consommation déconseillée. Insuffisants rénaux : réduire la posologie. Patients présentant une hypertrophie bénigne de la prostate : surveiller l'apparition de troubles mictionnels. Patients hypertendus ou atteints de cardiopathies : renforcer la surveillance clinique. INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES : Associations contre-indiquées : IMAO non sélectif ; risque de syndrome sérotoninergique, IMAO sélectif B ; risque d'hypertension paroxystique, Sumatriptan ; risque d'hypertension artérielle, vasoconstriction artérielle. Associations déconseillées : Adrenaline, noradrénaline ; Hypertension paroxystique avec possibilité de troubles du rythme, Clonidine et apparentés ; Inhibition de l'effet antihypertenseur de la clonidine, Digoxine ; risque de potentialisation des effets hémodynamiques. IMAO sélectif A ; risque d'apparition d'un syndrome sérotoninergique. Associations faisant l'objet de précautions d'emploi : Adrenaline, noradrénaline, Lithium. GROSSESSE ET ALLAITEMENT* : Contre-indication relative. EFFETS INDÉSIRABLES* : Communément rapportés : vertiges, hypersudation, anxiété, bouffées de chaleur et dysurie. Moins communément rapportés : nausées, vomissements, sécheresse buccale, constipation, tremblements et palpitations. Exceptionnels : syndrome sérotoninergique, en association. Élévation modérée des transaminases, sans traduction clinique. Par ailleurs, certains effets indésirables sont liés à la nature même de la maladie dépressive. SURDOSAGE* : Le surdosage n'entraîne pas de décès. Aux doses élevées, l'effet émétique limite considérablement le risque. Liste 1. IXEL 50 mg - AMM 341 985-7 (1996) - 56 gélules sous plaquettes thermoformées - Prix : 180,30 F. Liste 1. IXEL 25 mg - AMM 341 977-4 (1996) - 56 gélules sous plaquettes thermoformées - Prix : 105,30 F. Remboursés Séc. Soc. à 65 % et Agréés collect. INFORMATION MÉDICALE : <http://www.pierre-fabre.com> PIERRE-FABRE MÉDICAMENTS - 45, Parc Abel Gaucé - 92254 BOULOGNE. * Pour une information complète, se reporter à la fiche signalétique.



Pierre Fabre
Système Nerveux Central