



COMPOSITIO MATHEMATICA

La conjecture de Tate entière pour les cubiques de dimension quatre

Compositio Math. **151** (2015), 253–264.

[doi:10.1112/S0010437X14007386](https://doi.org/10.1112/S0010437X14007386)



FOUNDATION
COMPOSITIO
MATHEMATICA



LONDON
MATHEMATICAL
SOCIETY
150 YEARS



La conjecture de Tate entière pour les cubiques de dimension quatre

François Charles et Alena Pirutka

ABSTRACT

We prove the integral Tate conjecture for cycles of codimension 2 on smooth cubic fourfolds over an algebraic closure of a field finitely generated over its prime subfield and of characteristic different from 2 or 3. The proof relies on the Tate conjecture with rational coefficients, proved in that setting by the first author, and on an argument of Voisin coming from complex geometry.

RÉSUMÉ

Dans ce texte, on établit une version entière de la conjecture de Tate pour les cycles de codimension 2 sur une hypersurface cubique lisse X de \mathbb{P}^5 sur une clôture algébrique d'un corps de type fini sur son sous-corps premier et de caractéristique différente de 2 et 3. La preuve s'appuie sur la conjecture de Tate à coefficients rationnels prouvée dans ce cas par le premier auteur et sur un argument de géométrie complexe dû à Voisin.

1. Introduction

Soient k un corps de type fini sur son sous-corps premier, \bar{k} une clôture algébrique de k , ℓ un nombre premier différent de la caractéristique de k et X une variété projective lisse sur k . Notons G le groupe de Galois absolu de k . Pour tout entier positif r , la conjecture de Tate [Tat65] affirme que l'application classe de cycle à coefficients rationnels et à valeurs dans la cohomologie étale ℓ -adique

$$CH^r(X) \otimes \mathbb{Q}_\ell \rightarrow H^{2r}(X_{\bar{k}}, \mathbb{Q}_\ell(r))^G \quad (1)$$

est surjective.

Il est bien connu que la version entière qui affirme la surjectivité de l'application

$$CH^r(X) \otimes \mathbb{Z}_\ell \rightarrow H^{2r}(X_{\bar{k}}, \mathbb{Z}_\ell(r))^G \quad (2)$$

n'est en général pas vérifiée. Ce problème est discuté en détail dans [CS10]. Si r vaut 1, un argument classique montre que la surjectivité des applications (1) et (2) est équivalente.

Dans le problème entier énoncé au paragraphe précédent on peut distinguer deux questions. La première est l'analogie de la conjecture de Hodge entière, et demande l'existence de cycles sur la clôture algébrique du corps de base k . La seconde demande que ces cycles descendent à k lui-même. De façon plus précise, la première de ces questions demande si l'application

$$CH^r(X_{\bar{k}}) \otimes \mathbb{Z}_\ell \rightarrow \bigcup_H H^{2r}(X_{\bar{k}}, \mathbb{Z}_\ell(r))^H \quad (3)$$

Received 27 July 2013, accepted in final form 8 November 2013, published online 16 October 2014.

2010 Mathematics Subject Classification 14C25, 14G15, 14J70 (primary).

Keywords: conjecture de Tate, cubique de dimension 4, jacobienne intermédiaire, fonction normale.

This journal is © Foundation Compositio Mathematica 2014.

est surjective, où H parcourt les sous-groupes ouverts de G . Pour les classes de courbes, soit $r = \dim(X) - 1$, Schoen a montré dans [Sch98] que l'application (3) est surjective si la conjecture de Tate est vraie pour les diviseurs.

Le cas de la codimension au moins 2 est plus difficile. D'une part, certains contre-exemples à la conjecture de Hodge entière, comme celui d'Atiyah et Hirzebruch [AH62] s'adaptent à la caractéristique positive (voir [CS10]) pour fournir un contre-exemple à la conjecture de Tate entière. D'autre part, et c'est un problème qui ne se pose pas directement sous cette forme pour la conjecture de Hodge, il est faux en général que l'application $CH^r(X) \otimes \mathbb{Z}_\ell \rightarrow CH^r(X_{\bar{k}})^G \otimes \mathbb{Z}_\ell$ soit surjective si r est différent de 0, 1 et de la dimension de X , comme montré dans [Pir11].

La conjecture de Hodge entière pour les variétés dont la dimension de Kodaira est petite a été étudiée par Voisin et Høring–Voisin dans une série d'articles [HV11, Voi06, Voi07, Voi13b] qui aboutissent à la preuve de la conjecture de Hodge pour les classes entières dans la cohomologie en degré 4 pour les variétés de Calabi–Yau et les variétés uniréglées de dimension 3, ainsi que pour certaines variétés rationnellement connexes et certaines fibrations en cubiques de dimension 3. Les arguments de Voisin sont largement de nature transcendante, et font appel de manière cruciale à la notion de variation de structures de Hodge. La question de la validité de la conjecture de Tate entière est néanmoins abordée dans [Voi13a] pour les variétés rationnellement connexes. Parimala et Suresh [PS10] établissent une version forte de la conjecture de Tate entière pour les cycles de codimension 2 pour X une fibrations en coniques au-dessus d'une surface géométriquement réglée : pour une telle fibration X , l'application $CH^2(X) \otimes \mathbb{Z}_\ell \rightarrow H^4(X, \mathbb{Z}_\ell(2))$ est surjective. Ceci permet aussi d'obtenir la même conclusion pour un solide cubique lisse. Hors de ces travaux et du théorème de Schoen cité ci-dessus, il ne semble pas qu'il existe de résultat positif sur la conjecture de Tate à coefficients entiers sur les corps finis.

Dans [Voi07], Voisin montre que la conjecture de Hodge entière est vraie pour les cycles de codimension 2 dans une cubique lisse de \mathbb{P}_C^5 . Une des clés de la preuve est la méthode des fonctions normales de Zucker [Zuc76] qui généralise à la codimension supérieure la démonstration de Poincaré et Lefschetz de la conjecture de Hodge pour les classes de diviseurs. Le théorème principal de cet article étend ce résultat au cas des corps finis.

THÉORÈME 1.1. *Soit k un corps de type fini sur son sous-corps premier et de caractéristique différente de 2 et 3. Soit \bar{k} une clôture algébrique de k . Soit X une hypersurface cubique lisse de \mathbb{P}_k^5 . La conjecture de Tate entière est vraie pour les cycles de codimension 2 sur X . Autrement dit, pour tout nombre premier ℓ différent de la caractéristique de k , l'application classe de cycle*

$$CH^2(X_{\bar{k}}) \otimes \mathbb{Z}_\ell \rightarrow \bigcup_H H^4(X_{\bar{k}}, \mathbb{Z}_\ell(2))^H \tag{4}$$

est surjective, où G est le groupe de Galois absolu de k et H parcourt le système des sous-groupes ouverts de G .

Il est à remarquer que le cas où la caractéristique de k est nulle est déjà connu : il résulte de la conjecture de Tate à coefficients rationnels prouvé dans ce cas par André dans [And96, 1.6.1] – pour les corps de nombres, et le cas général s'en déduit – et de la conjecture de Hodge entière pour les cubiques de dimension 4 prouvée par Voisin dans [Voi07].

La version rationnelle de la conjecture de Tate pour les cubiques de dimension 4 sur les corps finis de caractéristique au moins 5 est démontrée dans [Cha13, Corollaire 6] – le cas des corps de type fini sur leur sous-corps premier s'en déduit par des techniques standard – et dans [Mad13, Théorème 5.14]. Il s'agit du point de départ de notre résultat.

Sa version rationnelle étant acquise, la preuve du théorème s’inspire de celle de [Voi07, Voi13b]. Il s’agit d’abord d’utiliser la méthode de Zucker en associant à une classe Galois-invariante une section de la fibration en jacobiniennes intermédiaires associée à un pinceau de Lefschetz de X . Ensuite, un résultat de Markushevich et Tikhomirov [MT01] permet de construire une famille de cycles algébriques à partir de toute section comme ci-dessus.

En général, les notions de jacobienne intermédiaire et de fonction normale, qui sont des objets de géométrie complexe, n’ont pas d’analogie en caractéristique positive. Dans notre cas, c’est la description due à Clemens et Griffiths [CG72], de la jacobienne intermédiaire d’une cubique de dimension 3 qui permet de donner un sens à la stratégie ci-dessus. À notre connaissance, il s’agit de la première utilisation des fonctions normales pour la construction de cycles algébriques sur un corps fini.

Pour finir cette introduction, remarquons qu’il est sans doute possible de démontrer le théorème principal de cette article par réduction à la caractéristique nulle – via certaines des méthodes de [Cha13] – et au résultat de Voisin. Vues les remarques précédentes, nous avons choisi de mettre en avant la possibilité de travailler en caractéristique non nulle.

2. Fonctions normales pour une fibration en cubiques

Dans cette section, nous considérons une situation un peu plus générale que celle du théorème 1.1. Soit k un corps de type fini sur son sous-corps premier, ou un corps algébriquement clos. Soit $\pi : Y \rightarrow T$ un morphisme entre les variétés projectives lisses sur k . On suppose que la fibre générique de π est une hypersurface cubique lisse de \mathbb{P}^4 . Autrement dit, π est une fibration en solides cubiques au-dessus de T . Soit U l’ouvert de T au-dessus duquel π est un morphisme lisse.

Pour simplifier les notations dans ce qui suit, et comme cette condition sera satisfaite dans le cas du théorème 1.1, nous supposons en outre que le groupe $H^3(Y_{\bar{k}}, \mathbb{Z}_\ell)$ est nul, où ℓ est un nombre premier différent de la caractéristique de k et où \bar{k} est une clôture algébrique de k . Cette hypothèse garantit que le système local $R^3\pi_*\mathbb{Z}_\ell$ sur U n’a pas de partie constante. En général, les énoncés qui suivent valent en quotientant par cette partie constante.

Supposons d’abord que le corps k soit le corps des nombres complexes \mathbb{C} . Nous répétons ici les constructions décrites dans [Zuc76, Voi13b]. Les chapitres 12 et 19 de [Voi02] contiennent également des précisions sur ce qui suit.

Si Y_t est une fibre lisse de π au-dessus d’un point complexe t de T , on dispose, suivant Griffiths [Gri68], de la jacobienne intermédiaire

$$J(Y_t) = \frac{H^3(Y_t, \mathbb{C})}{F^2 H^3(Y_t, \mathbb{C}) \oplus H^3(Y_t, \mathbb{Z})},$$

où F^\bullet est la filtration de Hodge. Il s’agit d’un tore complexe. D’après [Gri68] encore, ce qui précède vaut en famille, et l’on obtient une fibration $J \rightarrow U$ en jacobiniennes intermédiaires.

Soit maintenant α une classe de Hodge dans $H^4(Y, \mathbb{Z}(2))$ telle que la restriction de α à $H^4(Y_t, \mathbb{Z}(2))$ soit nulle pour une – ou toute – fibre lisse Y_t de π . La classe α induit dans ce cas une fonction normale ν_α associée à $J \rightarrow U$, c’est-à-dire une section de $J \rightarrow U$ vérifiant la propriété d’horizontalité.

Dans le cas où α est la classe de cohomologie d’un cycle Z de codimension 2 dans Y , que l’on supposera pour simplifier plat au-dessus de T , la fonction normale ν_α s’obtient comme suit. Si t est un point de U , soit $Z_t \in CH^2(Y_t)$ la restriction de Z à la fibre Y_t . Le cycle Z_t est par

hypothèse homologue à zéro dans Y_t . Son image par l'application d'Abel–Jacobi de Griffiths

$$\Phi_t : CH^2(Y_t)_{\text{hom}} \rightarrow J(Y_t)$$

est bien définie. C'est la valeur en t de la fonction normale ν_α .

Ce qui précède s'applique sans hypothèse sur la fibre générale de $Y \rightarrow T$. Dans cette généralité, il s'agit cependant d'une construction transcendante qui n'a pas de pendant connu sur un corps plus général que celui des complexes. Dans notre cas, la situation est en fait algébrique. En effet, si t est un point de U , il résulte de l'annulation du groupe $H^3(Y_t, \mathcal{O}_{Y_t})$ que la jacobienne intermédiaire $J(Y_t)$ est une variété abélienne par [Voi02, 12.2.2]. Plus généralement, la fibration en jacobiniennes intermédiaires $J \rightarrow U$ est un schéma abélien au-dessus de U . La suite de cette section est consacrée à la description de la fonction normale associée à un cycle comme ci-dessus au-dessus d'un corps k de type fini sur son sous-corps premier.

Nous utiliserons dans ce qui suit la cohomologie continue au sens de Jannsen [Jan88]. Si k est fini, il s'agit simplement de la cohomologie étale ℓ -adique. Soit ℓ un nombre premier différent de la caractéristique de k . Dans ce contexte, l'analogue de l'application d'Abel–Jacobi de Griffiths est l'application d'Abel–Jacobi ℓ -adique définie d'abord par Bloch [Blo84]. On renvoie à [Cha10] pour une discussion de la notion de fonction normale dans ce contexte. Soit \bar{k} une clôture algébrique de k , et soit ℓ un nombre premier différent de la caractéristique de k .

Soit maintenant α un élément du groupe de cohomologie ℓ -adique $H^4(Y, \mathbb{Z}_\ell(2))$ dont la restriction à une – ou toute – fibre géométrique lisse de π est nulle. Via la suite spectrale de Leray pour le morphisme π

$$E_2^{pq} = H^p(U, R^q \pi_* \mathbb{Z}_\ell(2)) \Rightarrow H^{p+q}(Y_U, \mathbb{Z}_\ell(2)),$$

la classe α induit un élément du groupe $H^1(U, R^3 \pi_* \mathbb{Z}_\ell(2))$, qui ne dépend que de l'image de α dans $H^4(Y_{\bar{k}}, \mathbb{Z}_\ell(2))$ puisque le groupe $H^3(Y_{\bar{k}}, \mathbb{Z}_\ell(2))$ est nul par hypothèse.

Au sens de [Cha10] par exemple, il s'agit de la classe de cohomologie de la fonction normale qu'il nous reste encore à construire. Pour ce faire, il faut décrire de manière géométrique la jacobienne intermédiaire d'une cubique de dimension 3. Cette description est essentiellement due à Clemens et Griffiths [CG72].

Rappelons que d'après [AK77, 1.12], le schéma paramétrant les droites contenues dans une hypersurface cubique lisse de dimension 3 est une surface lisse – c'est la *surface de Fano* de la cubique. Soit $\psi : F \rightarrow U$ la surface de Fano relative de π . Le morphisme ψ est projectif et lisse, de dimension relative 2. Ses fibres sont les surfaces de Fano des fibres de π . Soit V la variété d'incidence associée au-dessus de U , et p, q les deux morphismes canoniques de V dans F et Y_U respectivement. La dimension relative de V est 3. Cette situation correspond au diagramme suivant :

$$\begin{array}{ccc}
 & V & \\
 p \swarrow & & \searrow q \\
 F & & Y_U \\
 \psi \searrow & & \swarrow \pi \\
 & U &
 \end{array} \tag{5}$$

D'après [CG72, Théorème 11.19], le morphisme

$$p_* q^* : R^3 \pi_* \mathbb{Z}_\ell(2) \rightarrow R^1 \psi_* \mathbb{Z}_\ell(1)$$

est un isomorphisme de faisceaux étales sur U . Pour le voir, il suffit de montrer que c'est un isomorphisme en chaque fibre géométrique de π . Comme les hypersurfaces cubiques se relèvent en caractéristique zéro, on se ramène au cas des cubiques lisses de dimension 3 sur \mathbb{C} , où notre énoncé s'obtient à partir de celui prouvé par Clemens et Griffiths par dualité de Poincaré.

Soit maintenant $J \rightarrow U$ le schéma $\mathbf{Pic}^\tau(F/U)$ (cf. [Kle05]). Pour tout entier positif r , la suite exacte de Kummer

$$0 \rightarrow R^1\psi_*\mathbb{Z}/\ell^r\mathbb{Z}(1) \rightarrow J \xrightarrow{\ell^r} J \rightarrow 0 \tag{6}$$

induit une application

$$H^0(U, J)/\ell^r \rightarrow H^1(U, R^1\psi_*\mathbb{Z}/\ell^r\mathbb{Z}(1)).$$

En passant à la limite, on obtient une application

$$H^0(U, J) \otimes \mathbb{Z}_\ell \rightarrow H^1(U, R^1\psi_*\mathbb{Z}_\ell(1)). \tag{7}$$

Si ν est un élément de $H^0(U, J) \otimes \mathbb{Z}_\ell$, on note $[\nu] \in H^1(U, R^3\pi_*\mathbb{Z}_\ell(2))$ son image par le composé du morphisme précédent avec l'isomorphisme

$$(p_*q^*)^{-1} : H^1(U, R^1\psi_*\mathbb{Z}_\ell(1)) \rightarrow H^1(U, R^3\pi_*\mathbb{Z}_\ell(2)).$$

DÉFINITION 2.1. Soit α un élément du groupe $H^4(Y, \mathbb{Z}_\ell(2))$ dont la restriction aux fibres géométriques lisses de π est nulle. On dit qu'un élément ν de $H^0(U, J) \otimes \mathbb{Z}_\ell$ est une *fonction normale* associée à α si $[\nu]$ est l'image de α dans $H^1(U, R^3\pi_*\mathbb{Z}_\ell(2))$.

Contrairement à la situation sur le corps des complexes, on ne sait pas construire de fonction normale associée à une classe de cohomologie. Le résultat suivant montre que c'est possible pour les classes de cycles algébriques.

PROPOSITION 2.2. Soit α un élément du groupe $H^4(Y, \mathbb{Z}_\ell(2))$ dont la restriction aux fibres géométriques lisses de π est nulle. Si α est la classe de cohomologie d'un cycle de codimension 2 sur Y , alors il existe une fonction normale ν_α associée à α . De plus, ν_α appartient à l'image de $H^0(U, J)$ dans $H^0(U, J) \otimes \mathbb{Z}_\ell$.

Démonstration. Donnons une construction explicite de $\nu_\alpha \in H^0(U, J)$. Soit $Z \in CH^2(Y)$ un cycle algébrique de classe de cohomologie α . On note aussi Z la restriction de Z à l'ouvert Y_U par abus de notation.

Le cycle $Z' = p_*q^*Z$ est un élément de $CH^1(F)$, soit une classe d'équivalence rationnelle de diviseurs sur F . Comme la restriction de Z aux fibres géométriques lisses de π est homologiquement équivalente à zéro, il en va de même de la restriction de Z' aux fibres géométriques de ψ . Autrement dit, le diviseur Z' est de degré zéro sur les fibres géométriques de ψ , et correspond donc à une section ν_α de $J = \mathbf{Pic}^\tau(F/U)$.

Montrons que l'image de ν_α dans $H^0(U, J) \otimes \mathbb{Z}_\ell$ est la fonction normale associée à α . Soit β la classe de cohomologie du cycle Z' dans F . Par la suite spectrale de Leray associée à ψ , la classe β induit un élément de $H^1(U, R^1\psi_*\mathbb{Z}_\ell(1))$. Par functorialité de la correspondance p_*q^* , il s'agit de montrer que l'image de ν_α par la flèche (7) est égale à l'image de β dans $H^1(U, R^1\psi_*\mathbb{Z}_\ell(1))$. Pour ce faire, il suffit de montrer l'égalité des classes de cohomologie ci-dessus au-dessus du point générique de U , ce qui est essentiellement démontré dans [Ras95, Appendix]. Un résultat semblable dans un contexte plus général est aussi discuté dans [Cha10, Remarque 2 après le théorème 12]. \square

Enfin, on obtient ce qui suit.

PROPOSITION 2.3. *Soit α un élément du groupe $H^4(Y, \mathbb{Z}_\ell(2))$ dont la restriction aux fibres géométriques lisses de π est nulle, et soit N un élément de \mathbb{Z}_ℓ . S'il existe une fonction normale associée à $N\alpha$, alors il existe une fonction normale associée à α .*

Démonstration. La suite exacte longue de cohomologie associée à (6) donne la suite exacte

$$0 \rightarrow \varprojlim H^0(U, J)/\ell^r \rightarrow H^1(U, R^1\psi_*\mathbb{Z}_\ell(1)) \rightarrow T_\ell H^1(U, J)$$

où $T_\ell H^1(U, J)$ est le module de Tate de $H^1(U, J)$. Comme le groupe $H^0(U, J)/\ell$ est fini d'après les théorèmes de Mordell–Weil et de Lang–Néron, l'application

$$H^0(U, J) \otimes \mathbb{Z}_\ell \rightarrow \varprojlim H^0(U, J)/\ell^r$$

est surjective (voir [CK13, Lemme 2.1]). Comme le module de Tate $T_\ell H^1(U, J)$ est sans torsion, le conoyau de l'application (7) est sans torsion. Si l'image de $N\alpha$ dans $H^1(U, R^1\psi_*\mathbb{Z}_\ell(1))$ est dans l'image de (7), il en va donc de même de l'image de α . □

3. Preuve du théorème

Dans cette section on établit le théorème 1.1. Pour ce faire, nous allons appliquer à un pinceau de Lefschetz sur $X_{\bar{k}}$ la construction de la fonction normale de la section précédente.

LEMME 3.1. *Il existe un pinceau de Lefschetz de sections hyperplanes de $X_{\bar{k}}$.*

Démonstration. Cet énoncé est une conséquence des théorèmes d'existence de [SGA7, Exposé XVII]. Soit $X_{\bar{k}}^\vee$ la variété duale de $X_{\bar{k}}$ dans l'espace projectif \mathbb{P} des sections hyperplanes de $X_{\bar{k}}$. L'application de Gauss de $X_{\bar{k}}$ sur sa variété duale $X_{\bar{k}}^\vee$, qui à un point de $X_{\bar{k}}$ associe la section hyperplane découpée par l'hyperplan tangent, est finie de degré $3 \cdot 2^5$ comme l'exemple 3.4 de [SGA7, Exposé XVII] le montre, elle est donc génériquement non ramifiée car la caractéristique de k est différente de 2 et 3. D'après [SGA7, Exposé XVII, Proposition 3.5], le lieu lisse de $X_{\bar{k}}^\vee$ est un ouvert dense U de X^\vee . Par le théorème de Bertini, on peut trouver une droite de V_l qui intersecte $X_{\bar{k}}^\vee$ uniquement dans son ouvert de lissité U . Cette droite est un pinceau de Lefschetz vérifiant les propriétés du lemme. □

Conservant les notations du lemme, notons S le lieu de base du pinceau de Lefschetz considéré. Soit $\iota : Y \rightarrow X_{\bar{k}}$ l'éclatement de $X_{\bar{k}}$ le long de S . Le pinceau induit un morphisme $\pi : Y \rightarrow \mathbb{P}_k^1$ dont les fibres sont des hypersurfaces cubiques Y_t de dimension 3. Soit $U \subset \mathbb{P}_k^1$ l'ouvert de lissité de π et soit Y_U l'image réciproque de U dans Y .

LEMME 3.2. *Soit α un élément du groupe $H^4(X_{\bar{k}}, \mathbb{Z}_\ell(2))$. Il existe une classe algébrique α_0 dans $H^4(Y, \mathbb{Z}_\ell(2))$ telle que pour tout point géométrique t de U , la restriction α'_t de $\alpha' = \iota^*\alpha - \alpha_0$ à la fibre Y_t est nulle.*

Démonstration. Par construction, le diviseur exceptionnel de $\iota : Y \rightarrow X_{\bar{k}}$ est isomorphe à $S \times \mathbb{P}_k^1$. Comme S est une surface cubique sur \bar{k} , on dispose d'une droite l contenue dans S , ce qui donne une droite, que l'on note encore l , dans chaque section hyperplane Y_t . La restriction α_t de α à Y_t s'écrit $\alpha_t = b[l]$ pour un certain entier b indépendant de t . On peut donc prendre $\alpha_0 = b[l \times \mathbb{P}^1]$. □

Reprenons les notations de la section précédente, notant $\psi : F \rightarrow U$ la surface de Fano relative de π , V la variété d'incidence et $J \rightarrow U$ le schéma $\mathbf{Pic}^\tau(F/U)$. On note aussi $J^0 \rightarrow U$ le schéma $\mathbf{Pic}^0(F/U)$.

Soit α un élément de $H^4(X_{\bar{k}}, \mathbb{Z}_\ell(2))^H$, où $H \subset G$ est un sous-groupe ouvert. Par abus de notation, on note encore α la classe $\iota^*\alpha$ dans $H^4(Y, \mathbb{Z}_\ell(2))$. D'après le lemme 3.2, pour démontrer le théorème 1.1, on peut supposer que la restriction de α à toute fibre géométrique lisse de π est nulle. La proposition suivante permet alors d'associer à α une fonction normale $\nu_\alpha \in H^0(U, J) \otimes \mathbb{Z}_\ell$.

PROPOSITION 3.3. *Soit α un élément du groupe $H^4(X_{\bar{k}}, \mathbb{Z}_\ell(2))$ dont la restriction aux fibres géométriques lisses de π est nulle. Il existe alors une fonction normale $\nu_\alpha \in H^0(U, J) \otimes \mathbb{Z}_\ell$ associée à α .*

Démonstration. D'après la proposition 2.3, il suffit de montrer qu'il existe une fonction normale pour un multiple $N\alpha$ de la classe α . D'après [Cha13, Corollary 6] ou [Mad13, 5.14], la conjecture de Tate à coefficients rationnels vaut pour les cycles de codimension 2 sur $X_{\bar{k}}$. Il existe donc un multiple de α qui est combinaison linéaire à coefficients entiers ℓ -adiques de classes algébriques. L'énoncé résulte alors des propositions 2.2 et 2.3. □

Remarque 3.4. Comme suggéré par le rapporteur, pour X comme ci-dessus, on peut aussi établir la proposition 2.3 en utilisant le cas des diviseurs sur la variété de Fano F_X de X . En effet, via la correspondance d'incidence, la classe α induit une classe $\beta \in H^2(F_{X, \bar{k}}, \mathbb{Q}_\ell(1))$ dont un multiple est algébrique. La classe β est donc algébrique car la conjecture de Tate pour les diviseurs est équivalente à sa version entière. L'image de β dans F induit alors la classe dans $H^0(U, J)$ cherchée.

Pour construire un cycle algébrique sur Y à partir de la fonction normale ν_α , nous adaptons un argument de Voisin dans [Voi07, Theorem 18]. Le point clé est l'existence d'un espace de modules \mathcal{M}_t birationnel à la jacobienne intermédiaire J_t .

Soit $\mathcal{M} \rightarrow \mathbb{P}_k^1$ l'espace de modules des faisceaux semi-stables de rang 2 sans torsion dans les fibres de $Y \rightarrow \mathbb{P}_k^1$ vérifiant $c_1 = 0, c_2 = 2[l]$ dans la cohomologie des fibres géométriques de $Y \rightarrow \mathbb{P}_k^1$. D'après [Lan04a, Lan04b], \mathcal{M} est un schéma projectif au-dessus de \mathbb{P}_k^1 . L'application $p_*q^*(c_2 - 2l)$ induit l'application d'Abel–Jacobi au-dessus de U

$$\Phi : \mathcal{M}_U \rightarrow J.$$

PROPOSITION 3.5. *Soit s un point de U . Il existe une composante irréductible \mathcal{M}'_s de \mathcal{M}_s qui est birationnelle à J_s^0 par l'application d'Abel–Jacobi Φ_s .*

Démonstration. Soit κ le corps résiduel de s . D'après les résultats de Markushevich, Tikhomirov et Druel [MT01, Dru00], la proposition vaut si κ est de caractéristique nulle. En général, la cubique Y_s se relève en caractéristique nulle : il existe un anneau de valuation discrète R de corps résiduel κ et de corps des fractions K de caractéristique nulle et un R -schéma \mathcal{Y} dont la fibre spéciale est la cubique Y_s et la fibre générique est une cubique lisse sur K . Toujours d'après [Lan04a, Lan04b], on dispose d'une famille \mathcal{M}_R/R d'espaces de modules des faisceaux semi-stables sans torsion avec $c_1 = 0, c_2 = 2l$ et d'une application d'Abel–Jacobi $\Phi_R : \mathcal{M}_R \rightarrow \mathcal{J}$, où \mathcal{J}/R est la famille des jacobiniennes intermédiaires de \mathcal{Y} . Puisque K est de caractéristique nulle, l'application Φ_K est birationnelle d'après [MT01, Dru00]. L'application inverse $\mathcal{J} \dashrightarrow \mathcal{M}_R$ est définie en tout point de codimension 1 de \mathcal{J}^0 , puisque \mathcal{J}^0 est normale et \mathcal{M}_R est propre. Elle est donc définie au point générique de la fibre spéciale J_s^0 , d'où le résultat. □

COROLLAIRE 3.6. *Soit ν une section de J^0 au-dessus de U . Alors ν se relève en une section ν' de la flèche composée $\mathcal{M}_U \rightarrow U$.*

Démonstration. Il suffit de construire la section ν' au-dessus du point générique η de U . Par la proposition précédente, il existe une composante \mathcal{M}'_η de \mathcal{M}_η telle que l'application $\Phi_\eta : \mathcal{M}'_\eta \rightarrow J^0_\eta$ est un isomorphisme birationnel. L'énoncé est donc une conséquence du lemme de Nishimura [Nis55], comme J^0_η est une variété normale et \mathcal{M}'_η est propre. \square

COROLLAIRE 3.7. *Soit ν une section de J^0 sur U . Il existe une classe algébrique α dans $H^4(Y, \mathbb{Z}_\ell(2))$, de restriction nulle aux fibres géométriques lisses de π , telle que ν est une fonction normale associée à α .*

Démonstration. D'après le corollaire 3.6, on peut trouver une section $\nu' : U \rightarrow \mathcal{M}_U$ qui relève ν . Si l'espace de modules \mathcal{M} était un espace de modules fins, c'est-à-dire s'il existait une famille universelle de faisceaux sur \mathcal{M} – ou même sur le lieu correspondant aux points stables – le pull-back de cette famille à ν' nous fournirait la famille de courbes cherchée.

Il faut montrer comment contourner ce problème. Nous renvoyons à [Lan04a, Section 4] et à [HL10, Chapitre 4] pour une construction détaillée de \mathcal{M} . Le schéma \mathcal{M} est le quotient, au sens de la théorie géométrique des invariants de [Mum65], d'un ouvert d'un schéma $Q = \text{Quot}(\mathcal{O}_Y(-N)^r, P)$ au-dessus de $\mathbb{P}^1_{\bar{k}}$ qui paramètre les quotients de $\mathcal{O}_Y(-N)^r$ de polynôme de Hilbert P par le groupe $\text{GL}(r)$; r, N et P étant choisis de manière convenable.

Soit η le point générique de U , soit K le corps $\bar{k}(t)$ et soit x le point de $\mathcal{M}_\eta(K)$ image de η par ν' . D'après [DN89, Lemme 2.1], qui s'applique dans notre contexte, il existe une unique orbite fermée de $\text{GL}(r)$ dans $Q_{\bar{K}}$ au-dessus de x . En particulier, cette orbite est définie sur une clôture parfaite K^p de K . Notons C cette orbite. Comme la dimension cohomologique de K , et donc de K^p , est 1, l'ensemble des K^p -points de C est non-vide d'après le théorème de Springer [Ser94, p. 134]. Ainsi, on peut trouver une courbe propre et lisse D sur \bar{k} munie d'un morphisme $D \rightarrow \mathbb{P}^1_{\bar{k}}$ de degré d , où $d = 1$ si k est de caractéristique nulle et d est une puissance de la caractéristique de k sinon, et un morphisme $D \rightarrow Q$ qui relève la section ν' .

Même s'il n'existe pas nécessairement de fibré universel au-dessus de l'espace de modules \mathcal{M} , le schéma Q est lui un schéma Quot, au-dessus duquel l'existence d'un fibré universel est toujours vérifiée par définition; voir [Gro61] et le plus récent [HL10, 2.2]. Soit \mathcal{E} le faisceau sur $Y \times_{\mathbb{P}^1} D$ correspondant et soit $Z \in CH^2(Y) \otimes \mathbb{Z}_\ell$ défini par $Z = (1/d)\text{pr}_{Y,*}(c_2(\mathcal{E}) - 2[l \times D])$ où pr_Y est le morphisme de projection $Y \times_{\mathbb{P}^1} D \rightarrow Y$. D'après la construction et la proposition 2.2, ν est une fonction normale associée à la classe de Z . \square

Preuve du théorème 1.1. Soit $\alpha \in H^4(X_{\bar{k}}, \mathbb{Z}_\ell(2))$. D'après le lemme 3.2, quitte à modifier α par une classe algébrique, on peut supposer que la restriction de α aux fibres géométriques lisses de π est nulle. D'après la proposition 3.3, il existe une fonction normale $\nu_\alpha \in H^0(U, J) \otimes \mathbb{Z}_\ell$, associée à α . Quitte à multiplier α par une puissance de $p = \text{car.}k$, on peut supposer que $\nu_\alpha \in H^0(U, J^0) \otimes \mathbb{Z}_\ell$. Le corollaire 3.7 montre qu'il existe une classe algébrique $\beta \in H^4(Y, \mathbb{Z}_\ell(2))$, de restriction nulle aux fibres géométriques lisses de π , dont l'image dans $H^1(U, R^3\pi_*\mathbb{Z}_\ell(2))$ est égale à l'image de ν_α . Cela signifie que la classe $\alpha - \iota_*\beta$ dans $H^4(X_{\bar{k}}, \mathbb{Z}_\ell(2))$ s'annule dans $H^4(Y_U, \mathbb{Z}_\ell(2))$. Le théorème est maintenant une conséquence de la proposition ci-dessous – qui apparaît dans [Zuc76, p. 203] dans le cas complexe. \square

PROPOSITION 3.8. *Soit $\alpha \in H^4(X_{\bar{k}}, \mathbb{Z}_\ell(2))$. Si l'image de α dans $H^4(Y_U, \mathbb{Z}_\ell(2))$ est nulle, alors α est nulle.*

Démonstration. Le groupe $H^4(X_{\bar{k}}, \mathbb{Z}_\ell(2))$ est sans torsion, il suffit donc de travailler à coefficients rationnels. D'après [SGA7, Exposé XVIII, Théorème 5.6.8], la suite spectrale

$$E_2^{p,q} = H^p(\mathbb{P}_{\bar{k}}^1, R^q \pi_* \mathbb{Q}_\ell(2)) \implies H^{p+q}(Y, \mathbb{Q}_\ell(2)) \tag{8}$$

dégénère en E_2 . C'est aussi une conséquence du théorème de décomposition de [BBD82] : le faisceau $R\pi_* \mathbb{Q}_\ell$ se décompose dans la catégorie dérivée comme somme de ses ${}^p R^i \pi_* \mathbb{Q}_\ell[i]$, et, puisque l'on est au-dessus d'une courbe, faisceaux pervers et systèmes locaux se correspondent.

La filtration sur $H^4(Y, \mathbb{Q}_\ell(2))$ induite par la suite spectrale (8) a pour termes non nuls $H^0(\mathbb{P}_{\bar{k}}^1, R^4 \pi_* \mathbb{Q}_\ell(2))$, $H^1(\mathbb{P}_{\bar{k}}^1, R^3 \pi_* \mathbb{Q}_\ell(2))$ et $H^2(\mathbb{P}_{\bar{k}}^1, R^2 \pi_* \mathbb{Q}_\ell(2))$. Soit $j : U \hookrightarrow \mathbb{P}_{\bar{k}}^1$ l'inclusion de l'ouvert de lissité de π . D'après [SGA7, Exposé XVIII, Théorème 6.3], le morphisme d'adjonction

$$R^i \pi_* \mathbb{Q}_\ell \rightarrow j_* j^* R^i \pi_* \mathbb{Q}_\ell$$

est un isomorphisme. On a donc

$$H^0(\mathbb{P}_{\bar{k}}^1, R^4 \pi_* \mathbb{Q}_\ell(2)) = H^0(U, R^4 \pi_* \mathbb{Q}_\ell(2))$$

et

$$H^2(\mathbb{P}_{\bar{k}}^1, R^2 \pi_* \mathbb{Q}_\ell(2)) = H^2(\mathbb{P}_{\bar{k}}^1, \mathbb{Q}_\ell(1)) = \mathbb{Q}_\ell.$$

De plus, la flèche

$$H^1(\mathbb{P}_{\bar{k}}^1, R^3 \pi_* \mathbb{Q}_\ell(2)) \rightarrow H^1(U, R^3 \pi_* \mathbb{Q}_\ell(2))$$

est injective.

Notons que l'inclusion

$$H^2(\mathbb{P}_{\bar{k}}^1, R^2 \pi_* \mathbb{Q}_\ell(2)) \hookrightarrow H^4(Y, \mathbb{Q}_\ell(2))$$

envoie 1 sur la classe d'une section hyperplane d'une fibre lisse de π dans Y .

Soit maintenant α un élément de $H^4(X_{\bar{k}}, \mathbb{Q}_\ell(2))$ dont la restriction aux groupes $H^0(U, R^4 \pi_* \mathbb{Q}_\ell(2))$ et $H^1(U, R^3 \pi_* \mathbb{Q}_\ell(2))$ est nulle. D'après ce qui précède, son image $\iota^* \alpha$ dans $H^4(Y, \mathbb{Q}_\ell(2))$ est égale à l'image d'un multiple d'une section hyperplane d'une fibre lisse de π .

Par construction, le morphisme $\iota : Y \rightarrow X_{\bar{k}}$ est l'éclatement du lieu de base S du pinceau. L'orthogonal dans $H^4(Y, \mathbb{Q}_\ell(2))$ de $\iota^* H^4(X_{\bar{k}}, \mathbb{Q}_\ell(2))$ est donc $H^2(S, \mathbb{Q}_\ell(1))$, engendré par $[l \times \mathbb{P}_{\bar{k}}^1]$, où l est une droite dans S . Cela implique que la classe $\iota^* \alpha$ est nulle, ainsi que la classe α . \square

Remarque 3.9. De manière générale, on dispose d'une application rationnelle dominante $\mathbb{P}_{\bar{k}}^4 \dashrightarrow X_{\bar{k}}$ de degré 2. En effet, soient $l \subset X_{\bar{k}}$ une droite et $p : P \rightarrow l$ le fibré projectif $\mathbb{P}(T_{X_{\bar{k}}})|_l \rightarrow l$. La fibre générique de p est une quadrique de dimension 3 sur $\bar{k}(t)$, une telle quadrique a un point rationnel. La variété P est donc rationnelle. On a une application rationnelle dominante $P \dashrightarrow X_{\bar{k}}$ de degré 2, qui a une droite tangente à $X_{\bar{k}}$ en un point de l associe son troisième point d'intersection avec $X_{\bar{k}}$. Cette construction permet de montrer que le conoyau de l'application classe de cycle dans le théorème 1.1 est de torsion 2-primaire.

Remarque 3.10. La grande majorité de la démonstration permet d'aborder la surjectivité de l'application $CH^2(X) \otimes \mathbb{Z}_\ell \rightarrow H^4(X_{\bar{k}}, \mathbb{Z}_\ell(r))^G$ dans le cas d'un corps de base fini, quitte à prendre une extension de degré premier à ℓ . Le seul endroit dans lequel il est nécessaire de travailler sur \bar{k} est le corollaire 3.7. L'obstruction à démontrer la surjectivité de (2) est liée à la question de l'existence d'un cycle universel sur la jacobienne intermédiaire d'une cubique de dimension 3 posée dans [Voil3b, Question 1.6].

Remarque 3.11. Un certain nombre de nos arguments s'étendent aux fibrations en cubiques de dimension 3 quelconques. C'est notamment le cas de la partie 2. Deux points seulement ne s'étendent pas et nous empêchent d'obtenir l'analogie des résultats de [Voi13b].

Tout d'abord, on ne connaît pas la conjecture de Tate pour les cycles de codimension 2 à coefficients dans \mathbb{Q}_ℓ pour une fibration en cubiques de dimension 3. D'autre part, on ne peut pas en général se ramener au cas des classes dont la restriction aux fibres géométriques lisses de la fibration est nulle. Comme dans [Voi13b], cela implique de travailler avec des espaces de modules de courbes sur les cubiques de dimension 3 pour lesquels la fibre générique de l'application d'Abel–Jacobi est rationnellement connexe. Pour pouvoir appliquer le théorème de Graber, Harris et Starr et obtenir des sections de l'application d'Abel–Jacobi, il est alors nécessaire de passer à une extension finie du corps de base.

Ces deux obstructions étant prises en compte, il est vraisemblablement possible de vérifier que les résultats de [Voi13b] montrent l'annulation de la torsion du conoyau de l'application classe de cycle

$$CH^2(X_{\bar{k}}) \otimes \mathbb{Z}_\ell \rightarrow \bigcup_H H^4(X_{\bar{k}}, \mathbb{Z}_\ell(2))^H,$$

où H parcourt les sous-groupes ouverts du groupe de Galois absolu de k , et où X est une fibration en cubiques de dimension 3 sur une courbe, dont les fibres singulières ont au plus des points doubles ordinaires.

REMERCIEMENTS

Ce travail a largement bénéficié de deux séjours du premier auteur à l'Université de Strasbourg, que nous remercions pour son hospitalité. Nous remercions les ANR CLASS et Positive pour leur soutien financier. Nous remercions Jean-Louis Colliot-Thélène, Bruno Kahn, Tamás Szamuely et Claire Voisin pour leur lecture détaillée et leurs remarques précises qui nous ont permis d'améliorer et corriger la première version de ce texte.

REFERENCES

- AK77 A. Altman and S. Kleiman, *Foundations of the theory of Fano schemes*, Composito Math. **34** (1977), 3–47.
- And96 Y. André, *On the Shafarevich and Tate conjectures for hyper-Kähler varieties*, Math. Ann. **305** (1996), 205–248.
- AH62 M. F. Atiyah and F. Hirzebruch, *Analytic cycles on complex manifolds*, Topology **1** (1962), 25–45.
- BBD82 A. A. Beilinson, J. Bernstein and P. Deligne, *Faisceaux pervers*, in *Analyse et topologie sur les espaces singuliers I (Luminy, 1981)*, Astérisque, vol. 100 (Société Mathématique de France, Paris, 1982), 5–171.
- Blo84 S. Bloch, *Algebraic cycles and values of L-functions*, J. Reine Angew. Math. **350** (1984), 94–108.
- Cha10 F. Charles, *On the zero locus of normal functions and the étale Abel–Jacobi map*, Int. Math. Res. Not. IMRN **2010**(12) (2010), 2283–2304.
- Cha13 F. Charles, *The Tate conjecture for K3 surfaces over finite fields*, Invent. Math. **194** (2013), 119–145.
- CG72 H. Clemens and P. Griffiths, *The intermediate Jacobian of the cubic threefold*, Ann. of Math. (2) **95** (1972), 281–356.
- CK13 J.-L. Colliot-Thélène and B. Kahn, *Cycles de codimension 2 et H^3 non ramifié pour les variétés sur les corps finis*, J. K-Theory **11** (2013), 1–53.

- CS10 J. L. Colliot-Thélène and T. Szamuely, *Autour de la conjecture de Tate à coefficients \mathbb{Z}_ℓ sur les corps finis*, in *The geometry of algebraic cycles*, Clay Mathematics Proceedings, vol. 9, eds R. Akhtar, P. Brosnan and R. Joshua (American Mathematical Society, Providence, RI, 2010), 83–98.
- CV12 J.-L. Colliot-Thélène and C. Voisin, *Cohomologie non ramifiée et conjecture de Hodge entière*, *Duke Math. J.* **161** (2012), 735–801.
- DN89 J.-M. Drezet and M. S. Narasimhan, *Groupe de Picard des variétés de modules de fibrés semi-stables sur les courbes algébriques*, *Invent. Math.* **97** (1989), 53–94.
- Dru00 S. Druel, *Espace des modules des faisceaux de rang 2 semi-stables de classes de Chern $c_1 = 0$, $c_2 = 2$ et $c_3 = 0$ sur la cubique de \mathbb{P}^4* , *Int. Math. Res. Not. IMRN* **2000** (2000), 985–1004.
- Fal84 G. Faltings, *Complements to Mordell*, in *Rational points (Bonn, 1983/1984)*, *Aspects of Mathematics*, vol. E6 (Vieweg, Braunschweig, 1984), 203–227.
- Gri68 P. Griffiths, *Periods of integrals on algebraic manifolds, I; II*, *Amer. J. Math.* **90** (1968), 568–626; 805–865.
- Gro61 A. Grothendieck, *Techniques de construction et théorèmes d'existence en géométrie algébrique IV: les schémas de Hilbert*, *Séminaire Bourbaki* **6** (1960–1961), 249–276; Exposé no. 221.
- HV11 A. Höring and C. Voisin, *Anticanonical divisors and curve classes on Fano manifolds*, *Pure Appl. Math. Q.* **7** (2011), 1371–1393.
- HL10 D. Huybrechts and M. Lehn, *The geometry of moduli spaces of sheaves*, second edition, *Cambridge Mathematical Library* (Cambridge University Press, Cambridge, 2010).
- Jan88 U. Jannsen, *Continuous étale cohomology*, *Math. Ann.* **280** (1988), 207–245; *J. Inst. Math. Jussieu* **1** (2002), 467–476.
- Kle05 S. Kleiman, *The Picard scheme*, in *Fundamental algebraic geometry: Grothendieck's FGA explained*, *Mathematical Surveys and Monographs*, vol. 123 (American Mathematical Society, Providence, RI, 2005), 235–321.
- Lan04a A. Langer, *Moduli spaces of sheaves in mixed characteristic*, *Duke Math. J.* **124** (2004), 571–586.
- Lan04b A. Langer, *Semistable sheaves in positive characteristic*, *Ann. of Math. (2)* **159** (2004), 251–276.
- Mad13 K. Madapusi Pera, *The Tate conjecture for K3 surfaces in odd characteristic*, Preprint (2013), [arXiv:1301.6326](https://arxiv.org/abs/1301.6326), <http://www.math.harvard.edu/~keerthi/papers/tate.pdf>.
- MT01 D. Markushevich and A. Tikhomirov, *The Abel-Jacobi map of a moduli component of vector bundles on the cubic threefold*, *J. Algebraic Geom.* **10** (2001), 37–62.
- Mum65 D. Mumford, *Geometric invariant theory*, *Ergebnisse der Mathematik und ihrer Grenzgebiete*, vol. 34 (Springer, Berlin, 1965).
- Nis55 H. Nishimura, *Some remarks on rational points*, *Mem. Coll. Sci. Univ. Kyoto. Ser. A. Math.* **29** (1955), 189–192.
- PS10 R. Parimala and V. Suresh, *Degree three cohomology of function fields of surfaces*, Preprint (2010), [arXiv:1012.5367](https://arxiv.org/abs/1012.5367).
- Pir11 A. Pirutka, *Sur le groupe de Chow de codimension deux des variétés sur les corps finis*, *Algebra Number Theory* **5** (2011), 803–817.
- Ras95 W. Raskind, *Higher ℓ -adic Jacobi mappings and filtrations on Chow groups*, *Duke Math. J.* **78** (1995), 33–57.
- Sch98 C. Schoen, *An integral analog of the Tate conjecture for one-dimensional cycles on varieties over finite fields*, *Math. Ann.* **311** (1998), 493–500.
- Ser94 J.-P. Serre, *Cohomologie galoisienne*, *Lecture Notes in Mathematics*, vol. 5, fifth edition (Springer, Berlin, 1994).
- SGA7 P. Deligne and N. Katz (eds), *Groupes de monodromie en géométrie algébrique*, in *Séminaire de géométrie algébrique du bois marie 1967–1969 (SGA 7 II)*, *Lecture Notes in Mathematics*, vol. 340 (Springer, Berlin, 1973).

- Tat65 J. Tate, *Algebraic cycles and poles of zeta functions*, in *Arithmetical algebraic geometry: proceedings of a conference held at Purdue University December 5–7, 1963* (Harper and Row, New York, 1965), 93–110.
- Voi02 C. Voisin, *Théorie de Hodge et géométrie algébrique complexe*, Cours spécialisés, vol. 10 (Société Mathématique de France, Paris, 2002).
- Voi06 C. Voisin, *On integral Hodge classes on uniruled and Calabi-Yau threefolds*, in *Moduli spaces and arithmetic geometry (Kyoto, 2004)*, Advanced Studies in Pure Mathematics, vol. 45 (Mathematical Society of Japan, Tokyo, 2006), 43–73.
- Voi07 C. Voisin, *Some aspects of the Hodge conjecture*, Jpn. J. Math. **2** (2007), 261–296.
- Voi13a C. Voisin, *Remarks on curve classes on rationally connected varieties*, in *A celebration of algebraic geometry: a conference in honor of Joe Harris' 60th birthday*, Clay Mathematics Proceedings, vol. 18 (American Mathematical Society, Providence, RI, 2013), 591–599.
- Voi13b C. Voisin, *Abel-Jacobi map, integral Hodge classes and decomposition of the diagonal*, J. Algebraic Geom. **22** (2013), 141–174.
- Zar75 Yu. G. Zarhin, *Endomorphisms of Abelian varieties over fields of finite characteristic*, Izv. Akad. Nauk SSSR Ser. Mat. **39** (1975), 272–277.
- Zuc76 S. Zucker, *Generalized intermediate jacobians and the theorem on normal functions*, Invent. Math. **33** (1976), 185–222.
- Zuc77 S. Zucker, *The Hodge conjecture for cubic fourfolds*, Composito Math. **34** (1977), 199–209.

François Charles francois.charles@math.u-psud.fr
 Département de Mathématiques, Université Paris-Sud,
 Bâtiment 425, 91405 Orsay cedex, France

Alena Pirutka pirutka@math.unistra.fr
 Université de Strasbourg, IRMA – UMR 7501 du CNRS,
 7 rue René Descartes, 67084 Strasbourg cedex, France