



# ACTA NEUROPSYCHIATRICA

OFFICIEEL WETENSCHAPPELIJK ORGAAN VAN HET I G B P  
(INTERDISCIPLINAIR GENOOTSCHAP VOOR BIOLOGISCHE PSYCHIATRIE)

## INDEX ACTA NEUROPSYCHIATRICA 1992

IJLAGE BIJ 4e JAARGANG NUMMER 4 - DECEMBER 1992

De index bevat een auteursindex en een onderwerpindex, die beide alfabetisch zijn gerangschikt.  
In de auteursindex wordt de volledige citering uitsluitend onder de eerste auteur gegeven  
waarbij verwezen wordt naar de eerste pagina van het artikel.

De onderwerp index bevat de belangrijkste onderwerpen die in jaargang 4, 1992  
aan de orde zijn gekomen. Er wordt verwezen naar de eerste auteur en eerste artikelpagina.

# Xanax<sup>®</sup>

(alprazolam)



## Wat u mist in andere anxiolytica, vindt u als extra in Xanax<sup>®</sup>.

**Samenstelling :** Xanax<sup>®</sup> 0,25 en Xanax<sup>®</sup> 0,5 bevatten per tablet respectievelijk 0,25 mg of 0,5 mg alprazolam.

**Indicaties :** Symptomatische behandeling van pathologische angst en spanning.

**Contra-indicaties :** Myasthenia gravis. Overgevoeligheid voor benzodiazepinen.

**Bijwerkingen :** Slaperigheid, afvlakking van het gevoel, verminderde waakzaamheid, verwardheid, vermoeidheid, hoofdpijn, duizeligheid, spierzwakte en ataxie, dubbelzien. Deze verschijnselen doen zich vooral voor tijdens

het begin van de behandeling en verdwijnen doorgaans na voortgezet gebruik.

**Waarschuwingen :** Benzodiazepinen potentiëren de werking van andere sederende middelen en alcohol. Benzodiazepinen dienen niet bij kinderen te worden toegepast zonder dat de noodzaak daartoe zeer zorgvuldig is nagegaan. Ouderen en patiënten met een lever- of nierfunctiestoornis dienen bij voorkeur te worden behandeld met een lagere dan de gebruikelijke dosering. Aangezien de kans op onthoudingsverschijnselen groter is na een snelle afbouw en/of abrupt staken van de behandeling en na langdurig gebruik van

hoge doses is het aan te bevelen de behandeling geleidelijk te beëindigen.

**Dosering :** De optimale dosis Xanax<sup>®</sup> 0,25 of Xanax<sup>®</sup> 0,5 dient individueel te worden vastgelegd volgens de ernst van de symptomen en de reactie van de patiënt. Over het algemeen kunnen bij de meeste patiënten de symptomen van pathologische angst en spanning effectief worden behandeld met een dosering van 0,5 mg per dag tot een niet te overschrijden maximale dosering van 3 mg per dag, verdeeld over meerdere giften.

**Verpakkingen :** 30 tabletten.

**duphar**

**Upjohn**